

# Lezioni del 04/12/2022




Fig. 4.22 : approssimanti di  $\sin x$





Fig. 4.23 : approssimanti di  $e^x$

$$f(x) \quad x_0 \in I \quad f: I \rightarrow \mathbb{R}$$

"Approssimazione lineare di  $f(x)$  in un intorno di  $x_0$ ,  
o approssimazione di primo ordine"



$f$  derivabile in  $x_0$  : eq. retta tangente  $\bar{t}$

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\overline{BD} = \overline{CD} + \overline{BC}$$

$$\overline{CD} = \varepsilon(x)$$

$$\overline{BC} = \overline{AB} \operatorname{tg} \alpha$$

$$= f'(x_0)(x - x_0)$$

In conclusione:

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon(x)$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

Molte  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varepsilon(x)}{x - x_0} = 0$  : infatti,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varepsilon(x)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{\varepsilon(x)}}{x - x_0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{? "f'(x_0)"} - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) - f'(x_0) = 0$$

Quindi  $\varepsilon(x) = o(x-x_0)$   
per  $x \rightarrow x_0$

↓

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0)$$

per  $x \rightarrow x_0$

"approssimazione lineare o di primo ordine  
di  $f(x)$ "

$$f(x) = \sqrt{1+x} \quad x_0 = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \quad ; \quad f(0) = 1, \quad f'(0) = \frac{1}{2}$$

↘

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + o(x)$$

$$\sqrt{1+x} - 1 \approx \frac{x}{2} \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$h = x - x_0 \quad : \quad x = x_0 + h$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

per  $x \rightarrow x_0$

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h)$$

$h \rightarrow 0$

$$\textcircled{1} \quad \underbrace{\Delta f}_{\text{l'incremento di } f} = f'(x_0)h + o(h)$$

$h \rightarrow 0$

"Teorema del differenziale"  $\sim$  "tilde"

$\tilde{m}$

$f'(x_0)h$  = differenziale di  $f$  in  $x_0$ , corrispondente all'incremento  $h$

$$[df(x_0)(h) = f'(x_0)h] \quad \odot$$

$$\textcircled{1} \quad \Delta f \approx df(x_0)(h)$$

$$\underline{\underline{ES}} \quad dx(h) = 1 \cdot h = h$$

$$\underline{\underline{Quindi}} \quad d f(x) = f'(x_0) h = f'(x_0) dx(h)$$

⇓

$$\rightarrow \quad \underline{\underline{d f = f'(x_0) dx}}$$

$$\frac{df}{dx}(x_0) = f'(x_0)$$

## La formula di Taylor

$f = f(x)$  derivabile in  $]a, b[$  e derivabile due volte in  $x_0 \in ]a, b[$ .

$$E_2(x) = f(x) - \left[ \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2}_{\text{polinomio di II}^\circ \text{ grado}} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} E_2(x) = 0$$

$$\varepsilon_2(x) = o((x-x_0)^2) \quad x \rightarrow x_0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varepsilon_2(x)}{(x-x_0)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0) - \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2}{(x-x_0)^2} \quad \text{f.i. } \left[ \frac{0}{0} \right]$$

$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0) - f''(x_0)(x-x_0)}{2(x-x_0)} =$$

$$= (\text{per l'approssimazione lineare di } f'(x) \text{ gi\`u spiegato}) = 0$$

Altra:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2) \quad x \rightarrow x_0$$

Formula di Taylor di  $f(x)$  in  $x_0$ , al secondo

ordine.

$$o((x-x_0)^2) = \underline{\text{RESTO DI PEANO}}$$

In generale se  $f(x)$  è derivabile  $(n-1)$

volte in  $[a, b]$  e  $n$  volte in  $x_0$ ,

si ha

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 \\ &+ \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots + \\ \textcircled{3} &+ \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n) \\ &\qquad\qquad\qquad x \rightarrow x_0 \end{aligned}$$

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \quad \dots$$

La  $\textcircled{3}$  le chiamiamo formule di Taylor

di ordine  $m$ , di punto iniziale  $x_0$ .

ES.  $f(x) = e^x$        $x_0 = 0$

$$f(0) = 1$$

$$f'(x) = f''(x) = \dots = f^{(m)}(x) = e^x$$

$$f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(m)}(0) = 1$$

$x_0 = 0$ : formule di MACLAURIN

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(m)}(0)}{m!}x^m + o(x^m)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^m}{m!} + o(x^m)$$

Polinomio di Taylor di  $e^x$

$f(x) = \sin x$        $x_0 = 0$

$$f(0) = 0 ; f'(x) = \cos x ; f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\sin x , f''(0) = 0 ; f'''(x) = -\cos x$$



$$f'''(0) = -1$$

...

$$f^{(iv)}(x) = \operatorname{sh}x$$

$$f^{(iv)}(0) = 0$$

..

$$\operatorname{Sh}x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$+ \dots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+1})$$

$$\operatorname{Sh}x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+1})$$

ES.  $\operatorname{Sh}x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + o(x^7)$

$$\operatorname{Ch}x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m})$$

$$e^x = \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} + o(x^m)$$

$$\operatorname{Sh}x = \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2m+1})$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2m})$$

$$f(x) = \log(1+x) \quad x_0 = 0 \quad ?$$

$$e^x \approx \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} \quad \underline{\text{ERROR?}}$$

Proposizione (Formule di Taylor con il resto di Lagrange)

$f(x)$  derivabile  $m$  volte in  $]a, b[$  ed  $(m+1)$ -volte in  $x_0 \in ]a, b[$ :

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 \\ & + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots + \underbrace{R_m(x)} \\ & + \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}(x-x_0)^m + o\left(\frac{(x-x_0)^m}{x-x_0}\right) \end{aligned}$$

Allora 
$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(c)}{(m+1)!} (x-x_0)^{m+1}$$

dove  $c$  è un punto, dipendente da  $x$ ,  
intorno all'intervallo di estremi  $x_0$  ed  $x$

Teorema di Lagrange: 
$$f(x) - f(x_0) = f'(c)(x-x_0)$$

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(c)}_{\text{Resto di Lagrange}}$$

$$c \in (x_0, x)$$

Resto di  
Lagrange  
di  $\mathbb{R}$  ordine

ES:

$$f(x) = e^x$$

$$x_0 = 0$$

?

$$e^x = \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} + R_m(x)$$

$$R_m(x) = \frac{e^c}{(m+1)!} x^{m+1}$$

dove  $c$  è in  $(0, x)$  ( $x > 0$ )

Stima di  $R_n(x)$ ? Se  $x \in \underbrace{[-a, a]}_{|x| \leq a}$   
 $a > 0$ , allora

$$\begin{aligned} |R_m(x)| &= \frac{e^c}{(m+1)!} |x|^{m+1} \\ &\leq \frac{e^a}{(m+1)!} a^{m+1} \quad \forall x \in [-a, a] \end{aligned}$$


### APPLICAZIONI

(Condizione sufficiente di II<sup>o</sup> ordine per gli estremi relativi)

$x_0$  estremo relativo  $\Rightarrow$   ~~$f'(x_0) = 0$~~   $\rightsquigarrow ?$

$\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) < 0 \end{cases} \Rightarrow x_0$  pto di max. relativo

$$\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) > 0 \end{cases} \Rightarrow x_0 \text{ p.to di min. relativo}$$



$$f(x) = 1 - x^2$$

$$f'(x) = -2x = 0 \Leftrightarrow x = 0 : \text{unico p.to critico!}$$

$$f''(x) = -2 < 0 \Rightarrow x = 0 \text{ p.to di max.}$$